

life
くらし

健康110番

国際医療福祉大学病院です



森川康英医師

29 子供の便秘は2歳から4歳の間に始まる例が多く、食事内容の変化や通園や通学による環境の変化に伴って出現します。硬い便による排便時の痛みや不適切なトイレトレーニングで、排便することに不快感を持

孫の便秘がひどい

Q 5歳になる男の孫がいます。2歳の頃から便秘がひどくなり、最近はいん腸をしないとい週間以上も排便がありません。これまでもいくつかの医療機関で、下剤を処方されたのですが、一向によくならず、最近はいん腸を汚すようになり、小学校入学を控えて心配です。

A 子供の便秘は2歳から4歳の間に始まる例が多く、食事内容の変化や通園や通学による環境の変化に伴って出現します。硬い便による排便時の痛みや不適切なトイレトレーニングで、排便することに不快感を持

血便やしこりは赤信号

位置や形に異常があったりする場合、そして脊椎の異常や甲状腺の異常がある場合は専門医に相談をすべき赤信号状態ですので注意が必要です。


の塊がないか触診やエックス線、超音波などで確認を行います。さらに、必要に応じて注腸造影検査を行って、その際に実際に排便をさせてみて、排便に必要な筋力があるかを確認します。

もし、直腸が狭く造る影される場合には、ヒルシユスプルング病と診断され、1週間程度便塊の除去が行われると維持療法に移行しますが、

このような状態ではまず便の塊を取り除いた上で便通の改善のため維持療法を行います。1週間程度便塊の除去が行われると維持療法に移行しますが、

便秘の診察には主要な筋肉の緩み具合を観察することも行われます。

親御さんたちはゆったりとした気持ちで決してお子さんを責めたりせずに、幼稚園や学校の先生の理解と協力も得て状態の改善を目指すことが大切です。



正常な直腸肛門反射

刺激に応じて内肛門括約筋の圧の下降が認められる。この反射が無い場合にはさらに専門的な検査が必要となる

腸内括約筋反射(図) という反射があるか検査を受ける必要もありません。また、脊椎の先天異常の有無も調べてもらいましょう。下着の汚れが起きる場合には、便の塊によって直腸がふさがれている状態(便塞栓)があり、便塊の横を便汗が流れ落ちるために遺糞症という状態を生じていると思われる場合があります。

成人に用いられる薬の中には小児には適応がないものもあるので、注意が必要です。食物繊維も排便にとって効果があります。健康維持のために1日に必要な食物繊維は年齢15歳以上とされています。また、漢方薬も成人同様子供の便秘にとっても有効です。担当の先生に相談

日掲載

(第2、4、5木曜)

森川康英 (小児外科)